



alkoholische Reinigungs- und Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektion von Oberflächen

Anwendungsbereiche:

Descorapid® Tücher sind vorgetränkte, alkoholische Reinigungs- und Desinfektionstücher. Sie eignen sich ausgezeichnet für eine **schnelle und unkomplizierte Desinfektion** und Reinigung von Oberflächen wie z. B. Arbeitsflächen etc. in Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen oder auch Rettungs-, Kranken- und Notarztfahrzeugen.

Des Weiteren eignen sich Descorapid® Tücher für die Reinigung und Desinfektion sämtlicher Oberflächen wie z.B. Tische und Stühle, Türklinken und Handläufe im Wartezimmer der Arztpraxis, in Altenpflegeheimen, öffentlichen Einrichtungen oder Kindergärten, jeglicher alkoholbeständigen Oberflächen inkl. PC-Tastaturen in Labor und Diagnostik, im Büro, Zuhause oder unterwegs. Descorapid® Tücher sind der ideale Begleiter auf Reisen im Auto oder im Urlaub. Auch sind die Tücher für den Einsatz in der Kosmetikindustrie, in Kosmetikstudios und Schönheitssalons, sowie in der Lebensmittelindustrie und in den lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

Das Produkt ist frei von Aldehyden und quaternären Ammoniumverbindungen (QAVs) ebenso wie von Tensiden und Farbstoffen. Zusätzlich sind Descorapid® Tücher zur hygienischen Händereinigung geeignet.

Anwendungsempfehlung:

Prüfung (Wirkstofflösung)	Konzentration	Einwirkzeit
VAH – Flächendesinfektion mit Mechanik DGHM-Standardmethoden		
VAH – Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid geringe organische Belastung	unverdünnt	5 min
bakterizid, levurozid hohe organische Belastung	unverdünnt	30 s
EN-Methoden – Flächendesinfektion ohne Mechanik in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen		
EN 1276 (Phase 2 / Stufe 1) – bakterizid hohe organische Belastung	unverdünnt	30 s
EN 1650 (Phase 2 / Stufe 1) – levurozid hohe organische Belastung	unverdünnt	30 s
EN 13697 (Phase 2 / Stufe 2) – bakterizid, levurozid hohe organische Belastung	unverdünnt	2 min
DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung		
begrenzt viruzid* (inkl. HIV / HBV / HCV)	unverdünnt	30 s
Vacciniavirus	unverdünnt	30 s
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	unverdünnt	30 s

* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Besondere Eigenschaften:

- einfache, praktikable Anwendung
- vielseitig und flexibel einsetzbar
- frei von Aldehyden, QAVs, Tensiden und Farbstoffen
- angenehmer Geruch
- gute Reinigungsleistung

Zusammensetzung (Wirkstoffe):

100 g Tränklösung enthalten:
63,14 g Propan-2-ol

Inhalt:

120 Tücher getränkt mit 250 g Tränklösung;
Tuchgröße 14 cm x 22 cm

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der Verordnung **(EU) 2017/745** des Europäischen Rates über Medizinprodukte.



ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133
Tel.: +49 30 77992-200
Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
www.lysoform.de

Vertrieb in Österreich (NICHT nach EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert):
ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1020 Wien, Frankgasse 6 / Top 5
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66
Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Descorapid® Tücher

Listung:

- VAH-Liste (Wirkstofflösung)
- IHO-Liste (Lebensmittelherstellung)
- ÖGHMP-List

Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid*

Anwendung:

Tücher einzeln entnehmen; Deckel anschließend wieder gut verschließen, um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu vermeiden.

Flächendesinfektion mit Mechanik; Scheuer-Wischdesinfektion:

Die Oberfläche vollständig mit dem gebrauchsfertigen Desinfektionstuch abwischen (Scheuer-Wisch-Desinfektion).

Auf eine vollständige, lückenlose Benetzung achten; gegebenenfalls mehrere Tücher verwenden (Nass-Wischen). Tränklösung gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

Flächendesinfektion ohne Mechanik gemäß EN-Methoden:

Die Oberfläche vollständig durch das gebrauchsfertige Desinfektionstuch benetzen. Auf eine vollständige, lückenlose Benetzung achten; gegebenenfalls mehrere Tücher verwenden. Tränklösung gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

Lebensmittelberührende Oberflächen sind nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser von mindestens Trinkwasserqualität nachzuspülen. Starke Verunreinigungen durch z. B. Blut, Erbrochenes o. ä. sind vor der Desinfektion mechanisch zu entfernen.

Handhabung der Dose

Öffnen Sie die in der Dose befindliche Packung auf einer Seite und geben diese – zu einer Rolle geformt – mit der geöffneten Seite nach oben in die Dose.

Ziehen Sie das erste Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Öffnung im Deckel der Dose und setzen diesen wieder auf.

Wiederbefüllung der Dose

Der Deckel inklusive der inneren Öffnung ist vor jeder Wiederbefüllung ordentlich aufzubereiten. Verwenden Sie ein alkoholisches Flächendesinfektionsmittel, um alle Deckeloberflächen gründlich innen und außen zu desinfizieren. Sobald alle Oberflächen trocken sind, kann wie unter „Handhabung der Dose“ weiterverfahren werden. Verwenden Sie bitte nur Descorapid® Nachfüllpackungen.

Vor jeder Befüllung desinfizieren Sie sich die Hände und ziehen Sie neue Schutzhandschuhe an. Innerhalb von Hochrisikobereichen empfehlen wir, gänzlich auf den Einsatz von Nachfüllpackungen zu verzichten.

Besondere Hinweise:

- Alkoholische Desinfektionsmittel sollten nicht zur Desinfektion großer Flächen angewandt werden (Brand- und Explosionsgefahr!). Ausbringung: max. 50 ml/m².
- Von Zündquellen fernhalten; nicht rauchen. Heiße Flächen vor der Desinfektion abkühlen lassen. Elektrische Geräte ausschalten und auf einen spannungsfreien Zustand achten.
- Enthält flüchtige Substanzen. Auf eine ausreichende Belüftung achten.
- Zur Desinfektion alkoholempfindlicher Flächen (z. B. Acrylglas, alkohollösliche Lacke) nicht geeignet.
- Kontakt mit Augen, Schleimhaut und offenen Wunden vermeiden.

- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen (gem. BGV).
- Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung beachten.
- Bei einem Ersteinsatz oder Präparatewechsel sind die Oberflächen gründlich zu reinigen und zu spülen.
- Bitte beachten Sie die RKI -Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ (BuGBI 10/2022) sowie die Empfehlung des VAH und IHO zur Flächendesinfektion!
- Die Descorapid® Tücher sind nach Anbruch 3 Monate haltbar.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Geruch: alkoholisch
pH-Wert: 6–8 bei 20 °C
Flammpunkt: 21 °C gem. DIN 51755

Lieferformen:

Karton mit 12 Dosen à 120 Tüchern
Nachfüllpack: 12 Beutel à 120 Tücher

Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Biozid gem. Biozid-Verordnung
BAuA Reg.-Nr.: N-71859

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der Verordnung **(EU) 2017/745** des Europäischen Rates über Medizinprodukte.



ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133
Tel.: +49 30 77992-200
Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
www.lysoform.de

Vertrieb in Österreich (NICHT nach EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert):
ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1020 Wien, Frankgasse 6 / Top 5
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66
Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at